



Nonprofit corporations and independent licensees
of the Blue Cross and Blue Shield Association



MICHIGAN ONCOLOGY
QUALITY CONSORTIUM

تحديد مرحلة السرطان

هناك نوعان من "أنظمة" تحديد مرحلة سرطان المبيض:
AJCC - اللجنة الأمريكية المشتركة للسرطان التي تقر نظام
تحديد مرحلة السرطان **TNM**
• T = الورم
• N = العقد
• M = النقائل
FIGO – الاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة

إن مصطلح المرحلة يختلف عن الدرجة.

المرحلة هي "مكان وجود السرطان"
بينما الدرجة هي
"ما يبدو عليه السرطان تحت عدسة المجهر".

يتم تحديد مرحلة السرطان بطريقتين:
المرحلة السريرية
• بناءً على الاختبارات التي تُجرى قبل الجراحة
المرحلة المرضية
• بناءً على نتائج الجراحة و/أو الخزعات أو اختبارات عينات
الأنسجة
• تُستخدم لتخطيط العلاج
يساعد تحديد مرحلة السرطان الطبيب على فهم مدى انتشار
السرطان. فهو يحدد:
• مدى انتشار الورم الأساسي (الأول)
• انتشار السرطان إلى العقد الليمفاوية المجاورة
• انتشار السرطان إلى مواقع بعيدة
غالبًا ما يتم تحديد مرحلة السرطان بناءً على الخزعات. تشمل
المواقع الشائعة لأخذ عينة الخزعة:
• الثرب
• العقد الليمفاوية المجاورة
• الحوض
• البطن
• الحجاب الحاجز
• الصفاق
• الاستسقاء، إن وجد
• السائل الجنبى

الموقع الإلكتروني الخاص بنظام تحديد مرحلة السرطان للجنة **AJCC**:

www.cancer.org/cancer/ovarian-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html

الموقع الإلكتروني الخاص بنظام تحديد مرحلة سرطان المبيض لـ **FIGO**:

www.sgo.org/wp-content/uploads/2012/09/FIGO-Ovarian-Cancer-Staging_1.10.14.pdf