



分期

癌症分期有 2 种方式：

临床分期

- 基于术前检测

病理分期

- 基于手术和/或活检或组织样本化验的结果
- 用于规划治疗方案

分期有助于医生了解癌症扩散的程度。分期可确定：

- 原发（初生）肿瘤的范围
- 癌症向周边淋巴结扩散的情况
- 癌症向远处扩散的情况

通常根据活检结果确定分期。常见的活检部位包括：

- 周边淋巴结
- 网膜
- 骨盆
- 腹膜
- 腹部
- 腹水（如有）
- 隔膜
- 胸膜液

卵巢癌有两种分期“系统”：

AJCC - 维护 TNM 分期系统的美国癌症联合委员会 (American Joint Committee on Cancer)

- T = 肿瘤
- N = 淋巴结
- M = 转移

FIGO - 国际妇产科联盟 (International Federation of Gynecology and Obstetrics)

阶段不同于等级。

阶段是指“发展程度”，
等级是指“在显微镜下的观察结果”。

AJCC 分期网站：

www.cancer.org/cancer/ovarian-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html

FIGO 卵巢癌分期网站：

www.sgo.org/wp-content/uploads/2012/09/FIGO-Ovarian-Cancer-Staging_1.10.14.pdf