



TESTIMI

EKZAMINIMI RADIOGRAFIK

- Sasi të vogla rrezatimi që përdoren për të marrë imazhe të organeve dhe indeve brenda trupit
- Tumoret ndryshojnë shkallët e përthithjes së rrezatimit
- Mund të tregojë praninë, rritjen ose reagimin e kancerit ndaj trajtimit

TOMOGRAFIA E KOMPJUTERIZUAR (COMPUTED TOMOGRAPHY CT)

- Makineri e madhe me një tunel që merr imazhe të pjesës së brendshme të trupit
- Mund të tregojë praninë, rritjen ose reagimin e kancerit ndaj trajtimit
- Kryhet shpejt dhe pa dhimbje; për të dalluar strukturat nga njëra-tjetra, mjeku mund të kërkojë injektimin e një lënge kontrasti nëpërmjet një shpimi me gjilpërë të vogël në dorë ose krah

IMAZHERIA ME REZONANCË MAGNETIKE (MAGNETIC RESONANCE IMAGING MRI)

- Valë radio dhe magnete marrin imazhe të pjesës së brendshme të trupit
- Makineri e madhe me tunel të ngushtë; emeton nivel të lartë zhurme; përdoret për ekzaminimin e pacientit
- Mund të tregojë praninë, rritjen ose reagimin e kancerit ndaj trajtimit
- Mund të përdoret lëndë kontrasti
- Ekzaminimi zgjat 30-60 minuta ose më shumë

TOMOGRAFIA ME EMETIM TË POZITRONEVE (POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY PET)

- Valë radio dhe magnete marrin imazhe të pjesës së brendshme të trupit
- Makineri e madhe me tunel të ngushtë; emeton nivel të lartë zhurme; përdoret për ekzaminimin e pacientit
- Mund të tregojë praninë, rritjen ose reagimin e kancerit ndaj trajtimit
- Mund të përdoret lëndë kontrasti
- Ekzaminimi zgjat 30-60 minuta ose më shumë

EKOGRAFIA (ULTRASOUND US)

- Përdorimi i valëve zanore për të gjeneruar imazhe të pjesës së brendshme të trupit
- Tregon madhësinë, formën, vendndodhjen e pjesëve të trupit dhe indet e afërta
- Mund të tregojë masa dhe nëse masa është e ngurtë apo e mbushur me lëngje
- Mjeku mund të kërkojë bërjen e një ekografie transvaginale për diagnostikimin e kancerit të vezores

VLERËSIMI I TRAKTIT GASTROINTESTINAL (GASTRIC INTESTINAL GI)

- Çdo test që kontrollon rektumin, zorrën e trashë dhe të hollë dhe stomakun për kancer
- Testet më vendimtare janë kolonoskopia dhe/ose endoskopia: përdorimi i kolonoskopit për të parë dhe/ose për biopsinë e pjesës së brendshme të traktit gastrointestinal
- Teste të tjera të zakonshme por më pak invazive janë radiografia, skanimet CT dhe PET

ANALIZAT E GJAKUT

- Testi gjenetik – kontrollon historikun familjar
- CA-125 – analiza e markuesve tumoralë për kancerin e vezores
- CBC – analizë e gjakut komplet (Complete Blood Count) (p.sh. hemoglobina, trombocitet)
- Profili kimik – elektrolitet (p.sh. natriumi, kaliumi)
- Funkcioni i mëlçisë (p.sh. enzimata)

BIOPSIA E INDIT

- Një mostër indi hiqet nga trupi, në shumicën e rasteve gjatë ndërhyrjes kirurgjikale
- Mund të bëhet para ndërhyrjes kirurgjikale; indi hiqet me një gjilpërë shumë të hollë
- Dërgohet në një laborator patologjie për testim