



# ВИДИ ЛІКУВАННЯ

## ХІРУРГІЧНА ОПЕРАЦІЯ

- Основний або радикальний метод лікування в більшості випадків раку яєчників.
- Завжди виконується гінекологом-онкологом.
- Цілі хірургічного втручання:
  - видалення злоякісного новоутворення
  - визначення стадії раку
  - якщо пухлинні клітини розповсюдилися, то куди? Який розмір осередків?
- Хірургічна операція виконується одним із двох способів:
  - відкрита (на ділянці черевної порожнини роблять один довгий надріз)
  - лапароскопічна/роботизована (роблять три або чотири маленьких надрізи, щоб ввести трубку з камерою та хірургічні інструменти)
- Хірургічна операція може виконуватися до або після хімієтерапії.

## ТАРГЕТНА ТЕРАПІЯ

- Застосовується препарат, спрямований на конкретну чи унікальну особливість пухлинних клітин.
- Доступна за певних клінічних ситуацій.

## ІМУНОТЕРАПІЯ

- Застосовується препарат для стимулювання роботи імунної системи.
- Доступна за певних клінічних ситуацій.

## ГОРМОНАЛЬНА ТЕРАПІЯ

- Застосовується препарат, який перешкоджає виробленню в організмі певного гормону чи блокує його дію.
- Препарат приймають перорально (у вигляді таблеток).
- Як правило, призначають після хімієтерапії та/або хірургічної операції.

## ХІМІЄТЕРАПІЯ

- Хімічна речовина, розроблена для знищення пухлинних клітин.
- Є багато способів введення (наприклад, внутрішньовенно (intravenous, IV), перорально, введення в порожнину).
- Може призначатися з хірургічним втручанням або без нього.
- Якщо планується зменшити розмір злоякісної пухлини, хімієтерапія проводиться перед хірургічною операцією; тоді вона називається *неoad'ювантною* хімієтерапією.
- Якщо хімієтерапію призначають після хірургічного втручання, вона є ад'ювантною.
- Лікування – це розроблений план приймання пацієнтом медичних препаратів за призначенням лікаря. Як правило, препарати вводять внутрішньовенно (в/в) або за допомогою голки. Однак інші способи застосування також вважаються прийнятними залежно від типу препарату.
- Цикл – кількість разів застосування одного препарату чи комбінації певних лікарських засобів. Наприклад, пацієнт проходить цикл 2 із 6 циклів хімієтерапії.
- Курс лікування – тривалість хімієтерапії. Курс рахують тижнями чи місяцями, а також циклами. Приклад. Пацієнт пройде 4 курси лікування препаратами X і 4 курси лікування препаратом Y протягом тижнів А–В.

## ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

- Використання рентгенівського випромінювання чи інших типів енергії для знищення пухлинних клітин.
- Як правило, не застосовується під час лікування раку яєчників.
- Може призначатися для контролю симптомів, якщо пухлинні клітини розповсюдилися в інші органи (наприклад, мозок).