



العلاجات

الجراحة

- العلاج الأساسي أو الحاسم لمعظم سرطانات المبيض
- يجريها دائمًا طبيب الأورام النسائية
- أهداف الجراحة:
- إزالة السرطان
- تحديد مرحلة السرطان
- إذا انتشر السرطان، فما مكان وحجم الترسبات؟
- يمكن إجراء الجراحة بإحدى طريقتين:
- الجراحة المفتوحة (فتح البطن بشق جراحي واحد طويل)
- منظار البطن/الجراحة الروبوتية (فتح ثلاثة أو أربعة شقوق جراحية صغيرة لإدخال أنبوب بكاميرا وأدوات جراحية)
- يمكن إجراء الجراحة قبل العلاج الكيميائي أو بعده

العلاج الموجه

- عقار يستهدف خاصية محددة أو فريدة للخلايا السرطانية
- متوفر في حالات سريرية محددة

العلاج المناعي

- عقار مصمم لزيادة نشاط الجهاز المناعي
- متوفر في حالات سريرية محددة

العلاج الهرموني

- عقار يوقف إنتاج هرمون في الجسم أو يوقف عمل أحد الهرمونات
- حبوب أو أدوية فموية
- تُعطى عادةً بعد العلاج الكيميائي و/أو الجراحة

العلاج الكيميائي

- عامل كيميائي مطور لقتل الخلايا السرطانية
- يمكن إعطاؤه بطرق متعددة (على سبيل المثال، عبر الوريد (IV)، عن طريق الفم، في التجايف)
- يمكن إعطاؤه مع الجراحة أو من دونها
- إذا كان من المخطط محاولة تقليص الورم السرطاني، يمكن إعطاء العلاج الكيميائي قبل الجراحة؛ يسمى هذا العلاج الكيميائي التمهيدي المساعد
- العلاج الكيميائي الذي يُعطى بعد الجراحة يسمى العلاج المساعد
- العلاج هو الخطة الموضوعية للعقار (العقاقير) بأمر من الطبيب ويُعطى للمريض. بشكل عام، يُعطى العلاج عبر الوريد (IV) أو باستخدام إبرة. لكن هناك طرقًا أخرى مقبولة، بناءً على العقار.
- الدورة هي عدد المرات التي سيعطى فيها العقار أو مجموعة العقاقير. على سبيل المثال، يتلقى المريض الدورة رقم 2 من 6 دورات من العلاج الكيميائي.
- مسار العلاج هو طول مدة العلاج الكيميائي. يوصف مسار العلاج بالأسابيع أو الشهور، وبالدورات. مثال: سيتلقى المريض 4 دورات من العقاقير X و4 دورات من العقار Y على مدار A إلى B أسابيع.

العلاج الإشعاعي

- استخدام الأشعة السينية أو أنواع الطاقة الأخرى لقتل الخلايا السرطانية
- لا يُستخدم عادةً في علاج سرطان المبيض
- يمكن استخدامه لإدارة الأعراض إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم (مثل الدماغ)